

（品種：夢つくし・元気つくし  
ヒノヒカリF基準）



## 特裁米こよみ(県認証米・F基準)

※こよみに記載している肥料・農薬以外は使用できません。  
※こよみ以外の肥料・農薬を使用した場合は必ず報告して下さい。(県認証より除外します。)

月

旬

上

中

下

上

中

下

上

中

下

上

中

下

上

中

下

上

中

下

夢つくし

生育期間  
は種育苗田植／活着期有効分けつ期無効分けつ期幼穂形成期出穂期穂揃期登熟期間成熟期

水管理浅水中断灌水中断灌水浅水中断灌花落水

主な作業温湯消毒基肥の施用代かき箱施薬①田植6<sup>5</sup>/6<sup>15</sup>除草剤処理②穂肥穂いもち病防除時期③穂揃期防除(カメムシ)④収穫

穂肥の診断  
穂肥時の稲姿と幼穂長（主稈）  
  
・穂肥は葉色をみて量を加減する。  
・穂肥は出穂前（幼穂長2～3mm）頃使用する。

元気つくし

生育期間  
は種育苗田植／活着期有効分けつ期無効分けつ期幼穂形成期出穂期穂揃期登熟期間成熟期

水管理浅水中断灌水中断灌水浅水中断灌花落水

主な作業温湯消毒基肥の施用代かき箱施薬①田植6<sup>10</sup>/6<sup>20</sup>除草剤処理②穂肥穂いもち病防除時期③穂揃期防除(カメムシ)④収穫

ヒノヒカリF基準

生育期間  
は種育苗田植／活着期有効分けつ期無効分けつ期幼穂形成期出穂期穂揃期登熟期間成熟期

水管理浅水中断灌水中断灌水浅水中断灌花落水

主な作業温湯消毒基肥の施用代かき箱施薬①田植6<sup>10</sup>/6<sup>20</sup>除草剤処理②穂肥穂いもち病防除時期③穂揃期防除(カメムシ)④収穫

コナギ

ホタルイ

アゼナ

ヒメトビウンカ

セジロウunca

トバイロウunca

ミナミアオカメムシ

主な雑草及び害虫

斑点米カメムシ類対策

出穂10日前までに、カメムシ類の居場所となる、畦畔・草ムラの除草を徹底して、圃場への侵入をふせぎましょう。

| 名 称                    | 使用量          | 使用時期                      | 対象病害虫                                                                       |
|------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ツインターボフェルテラ<br>箱粒剤     | 1箱当たり<br>50g | は種時<br>(覆土前)<br>↓<br>移植当日 | いもち病、ウンカ類、フタオビコヤガ、ニカメイチュウ、<br>コブノメイガ、イネミズゾウムシ                               |
| サンフェスタ箱粒剤              |              | 移植3日前<br>↓<br>移植当日        | いもち病、ウンカ類、フタオビコヤガ、ニカメイチュウ、<br>コブノメイガ、イネミズゾウムシ                               |
| デジタルパワー箱粒剤<br>(ウンカ類対策) |              |                           | いもち病、ウンカ類、フタオビコヤガ、ニカメイチュウ、<br>コブノメイガ、イネミズゾウムシ<br>※縞葉枯病の原因となるヒメトビウンカへの効果が高い。 |

| 種 類   | 名 称        | 10a当たり使用量 | 使 用 時 期              |
|-------|------------|-----------|----------------------|
| 粒 剤   | キマリテ1キロ粒剤  | 1kg       | 田植時～10日（ノビエ3.0葉期まで）  |
| フロアブル | キマリテフロアブル  | 500ml     | ※ 田植同時処理可            |
| ジャンボ  | キマリテジャンボ   | 10パック     | 田植直後～10日（ノビエ3.0葉期まで） |
| 豆つぶ   | ガンガン豆つぶ250 | 250g      | 田植後3日～8日（ノビエ2.5葉期まで） |

※除草剤処理後1週間は田面が露出しないようにすると効果が安定する。

|                   | 名 称            | 10aあたり使用量                  | 使用時期              |
|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| いもち病<br>紋枯病<br>対策 | ダブルカットバリダ粉剤DL  | 3～4kg                      | 穂揃期まで             |
|                   | ダブルカットバリダフロアブル | 希釈倍率1000倍<br>散布液量60～200 ℓ  | 穂揃期まで             |
| いもち病<br>対策        | ビームゾル          | 希釈倍率1000倍<br>散布液量100～150 ℓ | 収穫7日前まで           |
|                   | ビーム粉剤DL        | 3～4kg                      |                   |
|                   | コラトップ1キロ粒剤12   | 1～1.5kg                    | 穂いもち：出穂30日前～5日前まで |
|                   | コラトップジャンボ      | 10～13バック                   | 穂いもち：出穂30日前～5日前まで |

※穂もち病防除時期：「コラトップは、穂ばらみ期（出穂5日前）まで」「液剤・粉剤は出穂直前」に散布する事が重要です。

| 名 称             | 10a当たり使用量                      | 使用時期     | 対象病害虫         |
|-----------------|--------------------------------|----------|---------------|
| キラップ粉剤DL        | 3～4kg                          | 収穫14日前まで | カメムシ類<br>ウンカ類 |
| キラップ粒剤          | 3kg                            |          |               |
| キラップフロアブル       | 希釈倍率1000～2000倍<br>散布液量60～200 ℓ |          |               |
| スタークル豆つぶ        | 250g                           | 収穫7日前まで  |               |
| ヘリ防除（キラップフロアブル） |                                | 収穫14日前まで |               |

| 雑草が残った場合        | 名 称                                 | 10a当たり使用量                     | 対象雑草                | 使用時期                    |                               |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                 | ※クリンチャーバスME液剤                       | 1000mℓ/水70～100ℓ               | ノビエ、広葉雑草            | 田植後15日～ノビエ5葉期但し収穫50日前まで |                               |
|                 | ※フォローアップ1キ口粒剤                       | 1kg                           | カヤツリグサ、ホタルイ         | 田植後15日～ノビエ5葉期但し収穫60日前まで |                               |
|                 | クリンチャーEW                            | 100mℓ/水25～100ℓ                | ノビエ                 | 田植後20日～ノビエ6葉期但し収穫30日前まで |                               |
|                 | クリンチャー1キ口粒剤                         | 1kg                           |                     | 田植後7日～ノビエ4葉期但し収穫30日前まで  |                               |
|                 | バスグラム液剤(ナトリウム塩)                     | 500～700mℓ/水70～100ℓ            | 広葉雑草、カヤツリグサ<br>ホタルイ | 田植後15日～55日但し収穫50日前まで    |                               |
| バスグラム粒剤(ナトリウム塩) | 3～4kg                               | 田植後15日～55日但し収穫60日前まで          |                     |                         |                               |
| 紋枯病対策           | 名 称                                 | 10a当たり使用量                     | 使用時期                |                         |                               |
|                 | リンバー粒剤                              | 3～4kg                         | 収穫30日前まで            |                         |                               |
| ウンカ類<br>対策      | トレボン粉剤DL                            | 3～4kg                         | 収穫7日前まで             |                         | 使用時期は発生に<br>応じて散布<br>(稲作情報参考) |
|                 | トレボン乳剤                              | 希釈倍率1000～2000倍<br>散布液量60～150ℓ | 収穫14日前まで            |                         |                               |
|                 | なげこみトレボン                            | 水溶性容器10個<br>(500mℓ)           | 5葉期以降～収穫21日前まで      |                         |                               |
| 葉いもち            | 穂いもち病対策の剤(コラトップ(初発10日前～初発時)、ビーム)を使用 |                               |                     |                         |                               |

| 品 種 名                            | 肥 料 名                            | 基肥           | 穂 肥    | 成 分 量        |               |               |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------|---------------|---------------|
|                                  |                                  |              |        | N            | P             | K             |
| 夢 つ く し<br>元 気 つ く し<br>ヒノヒカリF基準 | 福岡嘉穂ユークくん2号<br>(ニューフレイバーペースト846) | 35<br>(50)   | —<br>— | 7.2<br>(7.0) | 2.65<br>(2.9) | 4.15<br>(5.4) |
|                                  | 福岡嘉穂ユークくん3号                      | —            | 30     |              |               |               |
|                                  | 有機エムコート256<br>(基肥1回)             | 60<br>(1回のみ) | —      | 7.2          | 3.0           | 3.6           |

稲わらの全量還元・土壌改良資材の施用  
(10a当たり、ケイカル・ミネラルG・珪鉄のいずれかを160kg散布、または、とれ太郎を60kg散布)

| (使用しても化学農薬成分にカウントされません。) |                             |                |  |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 名 称                      | 10a当たり使用量                   | 使用時期           |                                                                                       |
| Zボルドー粉剤DL                | 3～4kg                       | 出穂20日<br>～10日前 |                                                                                       |
| ドイツボルドー-A                | 希釈倍率 2000倍<br>散布液量 60～150 l |                | <b>収穫早限</b><br>黄褐色粳比率70%<br>粳水分28%<br><b>収穫晚限</b><br>黄褐色粳比率80%                        |

**【注意】** 出穂前10日以降に散布すると穂に薬害が出ます!!

| (使用しても化学農薬成分にカウントされません。) |           |      |                                   |
|--------------------------|-----------|------|-----------------------------------|
| 名 称                      | 10a当たり使用量 | 使用方法 | 備 考                               |
| スクミンベイト3                 | 2～4kg     | 湛水散布 | 浅水にして、水口、深いところ等タニシの集まる所にスポット処理も有効 |

その他対策：生貝の捕殺、卵塊の圧殺、取水口への網設置、浅水管理、厳冬期の耕起等  
肥料・農薬の注文は予約購入で経済効果を上げましょう。  
農薬は、散布前に必ず農薬ラベルを確認し、散布時には、天候に注意し、他の作物にかからないように散布しましょう。  
この栽培暦はＪＡ米の生産基準を兼ねています。  
要件を満たさない米穀は区分してＪＡに出荷しましょう。

J Aふくおか嘉穂本所営農センター ☎24-7093    J Aふくおか嘉穂本所グリーンセンター ☎24-4200  
 J Aふくおか嘉穂嘉麻営農センター ☎57-4000    J Aふくおか嘉穂南部グリーンセンター ☎57-3915  
 飯塚普及指導センター ☎23-4154

平成29年1月作成

肥料・農薬・生産資材の購入はJ Aから!! 生産履歴は必ず記帳しましょう。