

令和5年産 コシヒカリ特栽米栽培ごよみ

JAふくおか嘉穂本所営農センター ☎24-7093
飯塚普及指導センター ☎23-4154

月	3			4			5			6			7			8			9			
旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中		
生育期間	は種の準備		は種	育 苗		田植	活着期間		有効分けつ期		無効分けつ期		幼穂形成期		出穂期		登熟期間		成熟期	収穫適期 (黄褐色籾70～80%)		
水管理						浅 水 管 理			間断灌水		中 干 し		間断灌水		浅水管理		間断灌水		落水(走り水)			
主な作業	温湯消毒			基肥の施用 代箱田 か施薬 植(4/25)			除草剤処理			溝切り 中干し を する。 乾燥が続く時は、通し水 中干しを開始する。 田植後40日目頃から軽く			穂肥 (出穂前20日)			出穂期 ウンカカメムシ防除			※落水時期 1. 収穫一週間前くらいに落水をする。(水管理を十分にしておかないと遅くまで落水期をのばすことはできない) 2. コシヒカリは、遅くまで登熟するので落水は遅らせた方がよい。		収 穫 黄褐色籾比率70% 籾水分28% 収穫晩限 黄褐色籾比率80% 籾水分24% 適期収穫に努めましょう	

○病害虫、雑草防除基準

赤とんぼB（農薬成分数：4）					(次のいずれか1つを選択)			(赤とんぼBでは中期除草剤は使用できません)				(次のいずれか1つを選択)			
体系	箱施薬				除草剤			中期除草剤				ウンカ・カメムシ防除			
	名称	使用量	使用時期	対象病害虫	名称	10a当たり 使用量	使用時期	名称	10a当たり 使用量	対象雑草	使用時期	名称	10a当たり 使用量	使用時期	対象病害虫
JAふくおか 嘉穂 育苗センター 購入苗	使用しない				キマリテ 1キロ粒剤	1kg ※田植同時処理可	田植時～10日 (ノビE3.0葉期まで)	使用しない				エクシード粉剤DL	3kg	収穫7日 前まで	カメムシ類 ウンカ類
					プライオリティ 1キロ粒剤		田植時～12日 (ノビE3.5葉期まで)								
					ビクトリーZ 1キロ粒剤		田植時～10日 (ノビE3.0葉期まで)								
					キマリテ フロアブル	500mℓ ※田植同時処理可	田植時～10日 (ノビE3.0葉期まで)					エクシード フロアブル	希釈倍率2000倍 散布液量60～150ℓ		
					プライオリティ フロアブル		田植時～12日 (ノビE3.5葉期まで)								
自家育苗	プリンス粒剤	1箱当たり 50g	は種時 (覆土前) と 移植当日	イネミズゾウムシ、 ウンカ類、 ニカメイチュウ、 コブノメイガ等	ビクトリーZ フロアブル	500mℓ ※田植同時処理不可	田植後5日～10日 (ノビE3.0葉期まで)	スタークル豆つぶ	250g						
					キマリテ ジャンボ	10パック	田植直後～10日 (ノビE3.0葉期まで)								
					プライオリティ ジャンボ		田植直後～12日 (ノビE3.5葉期まで)								
					ビクトリーZ ジャンボ		田植後5日～10日 (ノビE3.0葉期まで)		ヘリ防除 (エクシードフロアブル)	希釈倍率16倍 散布液量0.8ℓ					

※自家育苗の箱施薬は「プリンス粒剤」しか使用できません。

県認証米（農薬成分：7）					(次のいずれか1つを選択)					(次のいずれかを2つまで選択可)					
体系	箱施薬				除草剤			中期除草剤・防除				ウンカ・カメムシ防除			
	名称	使用量	使用時期	対象病害虫	名称	10a当たり使用量	使用時期	名称	10a当たり使用量	対象雑草・病気	使用時期	名称	10a当たり使用量	使用時期	対象病害虫
県認証米基準	ツインターボ箱粒剤08	1箱当たり50g	は種時(覆土前)→ 移植当日	いもち病、イネミズゾウムシ、ウンカ類	キマリテ1キロ粒剤	1kg ※田植同時処理可	田植時～10日(ノビE3.0葉期まで)	バサグラン液剤(ナトリウム塩)	500～700mℓ(希釈水量70～100ℓ)	広葉雑草、カヤツリグサ、ホタルイ	田植後15～55日、但し収穫50日前まで	エクシード粉剤DL	3kg	収穫7日前まで	カメムシ類、ウンカ類
					ブライオリティ1キロ粒剤		田植時～12日(ノビE3.5葉期まで)	バサグラン粒剤(ナトリウム塩)			3～4kg				
					ビクトリーZ1キロ粒剤		田植時～10日(ノビE3.0葉期まで)								
	プリンス粒剤			イネミズゾウムシ、ウンカ類、ニカメイチュウ、コブノメイガ等	キマリテフロアブル	500mℓ ※田植同時処理可	田植時～10日(ノビE3.0葉期まで)	クリンチャーEW	100mℓ(希釈水量25～100ℓ)	ノビエ	田植後20日～ノビE6葉期まで、但し収穫30日前まで	エクシードフロアブル	希釈倍率2000倍 散布液量60～150ℓ		
					ブライオリティフロアブル		田植時～12日(ノビE3.5葉期まで)	クリンチャー1キロ粒剤	1kg		田植後7日～ノビE4葉期まで、但し収穫30日前まで				
					ビクトリーZフロアブル		500mℓ ※田植同時処理不可	田植後5日～10日(ノビE3.0葉期まで)	モゲトン粒剤	2～3kg	藻類	藻類の発生始～発生盛期、但し、収穫45日前まで	スタークル豆つぶ		
	ゴウケツバスター箱粒剤		カメムシ類、いもち病、イネミズゾウムシ、ウンカ類など	キマリテジャンボ	10パック	田植直後～10日(ノビE3.0葉期まで)	ゴウケツ1キロ粒剤	1kg	いもち病	出穂5日前まで(収穫30日前まで)	ヘリ防除(エクシードフロアブル)	希釈倍率16倍 散布液量0.8ℓ			
				ブライオリティジャンボ		田植直後～12日(ノビE3.5葉期まで)									
				ビクトリーZジャンボ		田植後5日～10日(ノビE3.0葉期まで)									

施肥基準

地帯	肥料名	基肥	穂肥	成分量(kg/10a)		
				N	P	K
平坦地	福岡嘉穂ユーキくん2号	35	—	5.7	2.2	2.95
	(フレーバーペースト)	(40)	—	(4.3)	(1.65)	(2.8)
	福岡嘉穂ユーキくん3号	—	15			
	有機エムコート355(基肥1回)※軽量化肥料	45	—	5.85	2.25	2.25
山中ろ山く間・地	福岡嘉穂ユーキくん2号	30	—	5.1	1.95	2.7
	(フレーバーペースト)	(35)	—	(3.95)	(1.5)	(2.6)
	福岡嘉穂ユーキくん3号	—	15			
	有機エムコート355(基肥1回)※軽量化肥料	40	—	5.2	2.0	2.0

稲わらの全量還元・土壌改良資材の施用

10a当たり、ケイカル・ミネラルG・珪鉄のいずれかを160kg散布、または、とれ太郎を60kg散布。

イネカメムシ対策

新害虫イネカメムシの特徴は出穂期後の幼い籾の基部を吸汁し不稔籾発生の要因となります。その為、対策としては出穂期に1回、出穂期後7～10日に1回の2回防除が必要となります。



イネカメムシ

特栽米の条件

- ※こよみに記載している肥料・農薬等しか使用できません。
- ※他の肥料・農薬等を使用した場合は、必ず報告をお願いします（特栽米より除外します）。

穂肥の診断

穂肥時の稲姿と幼穂長(出穂前20日)



- ・フルイ目 1.85mm
- ・タンパク含有率 6.8%以下
- ・種子更新率 100%
- ・玄米水分 14.5～15.0%
- ・等級 1・2等
- ・入れ目 1%以上(30.6kg)
- ・栽培履歴(必須)

- ・穂肥は葉色をみて量を加減する。
- ・穂肥は出穂前20日(幼穂長2～3mm)頃使用する。

農薬は、散布前に必ず農薬ラベルを確認し、散布時には、天候に注意し、他の作物にかからないように散布しましょう。この栽培暦はJA米の生産基準を兼ねています。要件を満たさない米穀は区分してJAに出荷しましょう。

JAふくおか嘉穂本所グリーンセンター ☎24-4200
JAふくおか嘉穂南部グリーンセンター ☎57-3915

令和4年11月作成

肥料・農薬・生産資材の購入はJAから!! 生産履歴は必ず記帳しましょう。